

CORIPRAVAC

Vacuna inactivada, Coriza infeccioso aviar, en emulsión inyectable

COMPOSICIÓN:

Haemophilus paragallinarum inactivado, serotipos A, B y C.

El gran incremento en estos últimos años de los procesos de coriza en las aves, causantes de bajas producciones en la puesta y de efectos crónicos de tipo respiratorio, ha creado la necesidad de su inmediato control. La inmunoprofilaxis mediante CORIPRAVAC permite la prevención del coriza al contener una cepa inactivada de cada uno de los tres serotipos (A, B y C) adyuvantados, que inducen una alta respuesta inmunogénica.

INDICACIONES:

Ponedoras y Reproductoras: Prevención del Coriza infeccioso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular en la pechuga.

POSOLOGÍA:

Ponedoras y Reproductoras: 0,5 ml/ave.

En general, es aconsejable vacunar a las 12 semanas y revacunar a las 18 semanas.

TIEMPO DE ESPERA:

0 días.

OBSERVACIONES:

- Si por error se usa la vía subcutánea, pueden producirse edemas regionales.
- La vacunación contra el coriza infeccioso aviar realizada con esta vacuna puede efectuarse simultáneamente con otras vacunas aviares.

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁ TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE EL MEDICAMENTO A LOS ANIMALES:

Advertencias para el usuario:

Este producto contiene un aceite mineral. Su inyección accidental (autoinyección) puede provocar dolor agudo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación o en un dedo y, ocasionalmente, podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona con urgencia atención médica.

En caso de inyectarse accidentalmente este producto, busque urgentemente atención médica, incluso si se ha inyectado una cantidad muy pequeña y lleve el prospecto consigo.

Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, solicite de nuevo atención médica.

Advertencias para el médico:

Este producto contiene un aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este producto puede causar una inflamación intensa, que podría ocasionar una necrosis isquémica e, incluso la pérdida del dedo. Es necesaria la atención médica experta e INMEDIATA, y puede ser preciso practicar tempranamente una incisión e irrigar la zona, especialmente si está afectada la yema del dedo o un tendón.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Administrar la vacuna cuando esté a temperatura ambiente de unos +15 a +25 °C.
- Agitar bien antes y durante su administración.
- Guardar entre +2 y +8 °C, evitando su posible congelación.

PRESENTACIÓN:

Botella 1.000 ds.

Prescripción veterinaria
PARA USO VETERINARIO

CORIPRAVAC

Inactivated vaccine against Infectious coryza, in injectable emulsion

COMPOSITION:

Inactivated *Haemophilus paragallinarum* (serotypes A, B and C).

The incidence of infectious coryza has increased substantially over the last years, causing egg drop and chronic respiratory problems in poultry. Prophylactic measures are required to control the spread of this disease. The use of CORIPRAVAC prevents the appearance of coryza, since it contains an inactivated strain of A, B and C adjuvanted serotypes, which confer a high immunogenic response.

INDICATIONS:

Layers and Breeders: To prevent Infectious coryza.

ADMINISTRATION ROUTE:

Intramuscular, into the breast muscles.

DOSAGE:

Layers and Breeders: 0.5 ml/bird.

Generally, it is recommended to vaccinate at 12 weeks and revaccinate at 18 weeks.

WITHDRAWAL PERIOD:

0 days.

OBSERVATIONS:

- If administered accidentally by subcutaneous route, regional oedemas may appear.
- This vaccine against infectious coryza can be administered simultaneously with other poultry vaccines.
- This product contains a mineral oil based compound. It may cause severe pain and inflammation in the case of accidental self-injection. Clean and disinfect the wound immediately, see a doctor and show him this leaflet.

SPECIAL PRECAUTIONS:

- It is advisable to administer the vaccine at a temperature between +15 and +25 °C.
- Shake before and during administration.
- Store at +2 to +8 °C, avoiding freezing.

PRESENTATION:

Bottle of 1,000 ds.

Under veterinary prescription
FOR VETERINARY USE ONLY



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com