

HIPRABOVIS 3

Vacuna trivalente inactivada contra los virus IBR, PI3 y BVD, en suspensión inyectable

COMPOSICIÓN:

Virus inactivados IBR, PI3 y BVD.

HIPRABOVIS 3, es una vacuna trivalente que induce la inmunidad activa frente a los virus de IBR, BVD y PI3 a fin de prevenir el Síndrome respiratorio bovino y el fallo reproductivo asociado a los virus IBR y BVD (infertilidad, aborto y vulvovaginitis pustular infecciosa).

INDICACIONES:

Bovinos adultos (Vacas y Novillas): Prevención de la Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), Vulvovaginitis pustular infecciosa (IPV) y Diarrea vírica bovina (incluida la Enfermedad de las mucosas) (BVD).

Terminos: Prevención de la Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), Parainfluenza 3 (PI3) y Diarrea vírica bovina (incluida la Enfermedad de las mucosas) (BVD).

POSOLOGÍA:

Bovinos (Terminos, Vacas y Novillas): 3 ml/bovino a partir de las 4-6 semanas de edad, independientemente de su peso y edad.

FORMA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Inyección intramuscular, en los músculos del cuello; o subcutánea, en la región de la papada.

PROGRAMA VACUNAL ORIENTATIVO:

Terminos: Vacunar con una dosis. Es aconsejable revacunar a los 21-30 días, sobre todo si se vacunan animales muy jóvenes. Dosis de recuerdo una vez al año.

Vacas: Vacunar con una dosis y revacunar a los 21-30 días. Dosis de recuerdo una vez al año.

Novillas: Vacunar con una dosis y revacunar a los 21-30 días, un mes antes de la primera cubrición. Dosis de recuerdo una vez al año.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

- Vacunar únicamente animales sanos.
- Usar material estéril para su administración.
- El uso de la vacuna será inmediato una vez abierto el envase.
- Administrar la vacuna cuando esté a temperatura ambiente entre +15 y +25 °C.
- Agitar antes de usar.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede aparecer una reacción anafiláctica en algún animal sensibilizado. En este caso, administrar epinefrina o un medicamento similar.

USO DURANTE GESTACIÓN Y LACTANCIA:

Puede utilizarse en cualquier momento durante la gestación o la lactancia.

TIEMPO DE ESPERA: 0 días.

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el prospecto.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Guardar en un lugar oscuro entre +2 y +8 °C. No congelar.

PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBEN OBSERVARSE PARA ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO Y/O LOS ENVASES:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

PRESENTACIÓN:

Frasco 5 ds.

Frasco 30 ds.

Reg. nº 2771 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria

USO VETERINARIO

HIPRABOVIS 3

Trivalent inactivated vaccine against IBR, PI3 and BVD viruses, in injectable suspension

COMPOSITION:

Inactivated viruses of IBR, PI3 and BVD.

HIPRABOVIS 3 is a trivalent vaccine that induces active immunity against the IBR, BVD and PI3 viruses to prevent Bovine respiratory syndrome and the reproductive failure associated with the IBR and BVD viruses (infertility, abortion and infectious pustular vulvovaginitis).

INDICATIONS:

Adult cattle (Cows and Heifers): To prevent Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), Infectious pustular vulvovaginitis (IPV) and Bovine viral diarrhoea (including the Disease of the mucosae) (BVD).

Calves: To prevent Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), Parainfluenza 3 (PI3) and Bovine viral diarrhoea (including the Disease of the mucosae) (BVD).

DOSAGE:

Cattle (Calves, Cows and Heifers): 3 ml/cattle from 4-6 weeks of age, for all weights and ages.

ADMINISTRATION ROUTE AND FORM:

Intramuscular, into the neck muscles; or subcutaneous, into the dewlap.

ORIENTATIONAL VACCINATION PROGRAMME:

Calves: Vaccinate with one dose. Revaccinate 21-30 days later, especially when very young calves are vaccinated. Administer a booster vaccination once a year.

Cows: Vaccinate with one dose. Revaccinate 21-30 days later. Administer a booster vaccination once a year.

Heifers: Vaccinate with one dose. Revaccinate 21-30 days later, one month before the first mating. Administer a booster vaccination once a year.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR USE:

- Vaccinate only healthy animals.
- Use sterile material when administering.
- Use the vaccine immediately after the container has been opened.
- Administer the vaccine at a temperature between +15 and + 25 °C.
- Shake before use.

ADVERSE REACTIONS:

A sporadic anaphylactic reaction may appear in some sensitive animal. In such a case administer epinephrine or a similar drug.

USE DURING PREGNANCY AND LACTATION:

Can be administered at any time during pregnancy and lactation.

WITHDRAWAL PERIOD:

0 days.

SPECIAL PRECAUTIONS:

If you are accidentally injected with this product, seek prompt medical advice and take the package leaflet with you.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR STORAGE:

Store in a dark place between +2 and +8 °C. Do not freeze.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR THE DISPOSAL OF UNUSED MEDICINAL PRODUCT OR WASTE MATERIALS, IF ANY:

Any unused veterinary medicinal product or waste materials derived from such veterinary medicinal products should be disposed of in accordance with local regulations.

PRESENTATION:

Vial of 5 ds.

Bottle of 30 ds.

Reg. nº 2771 ESP

Under veterinary prescription

FOR VETERINARY USE ONLY



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com